



# 子どもの予防接種

市では、子どもが健やかで元気な生活を送ることができるよう、各種定期予防接種を無料でを行っています。(対象期間内のみ無料)

左表は、子どもの定期予防接種の年間計画表で、接種は努力義務となっています。乳児訪問時に配布した「予防接種と子どもの健康」を必ずご覧になり、接種回数や接種間隔のルールをご確認のうえ、子どもの体調に合わせて計画的に予防接種を行いましょ。同時接種をご希望の方は、医療機関にご相談ください。

## 予防接種を受ける時の注意事項

- ▼ 予防接種を受ける際は、事前に母子健康手帳で接種履歴をご確認ください。
- ▼ 治療中の病気や体のことで気になることは、主治医に接種を受けて良いか必ずお尋ねください。必要な場合は母子健康手帳に記入してもらうか、意見書をもらってください。
- ▼ 内服薬、軟膏などを使用中の方は、使用されている薬の説明書をご持参ください。
- ▼ 問診票は乳児訪問時に配布していますが、紛失しないように十分ご注意ください。紛失された場合は、必ず母子健康手帳を持参の上、一の宮保健センターまたは内牧支所にお越しください。

## 予防接種に保護者が同伴できない場合は？

定期予防接種は原則保護者の同伴が必要ですが、特段の理由により同伴できない場合は、お子さんの健康状態を普段からよく知っている親族が同伴し接種することができます。その場合には、必ず問診票裏面にある委任状を記入し、接種医療機関にご提示ください。

## 接種方法

予約制となっていますので、必ず電話予約をして、母子健康手帳と問診票を持参し、体調を整えて接種しましょう。

## その他

- ▼ 小学6年生の二種混合(ジフテリア・破傷風)は、別途対象者に通知します。
- ▼ 「子宮頸がんワクチン」は、国の指示により、積極的接種差し控え中のため、積極的に勧めていません。ご希望の方は、一の宮保健センターに相談し、接種医療機関の医師より効果と副反応などのリスクの説明を受けた上で接種をお願いします。
- ▼ 季節性のインフルエンザ予防接種は、別途、広報誌とお知らせ端末などでお知らせします。

● 問い合わせ 一の宮保健センター ☎22・5088

● 委託医療機関 (予約制) ※母子健康手帳と問診票をご持参ください (必ず電話予約をしてください)

医療機関名	電話	住所	予防接種の種類											
			ヒブ	小児用肺炎球菌	BCG	不活化ポリオ	水痘	三種混合	四種混合	麻しん風しん	日本脳炎	二種混合	子宮頸がん	
古閑医院	☎ 22-3000	一の宮町宮地 1446-1									●	●		●
松見内科クリニック	☎ 22-0260	一の宮町宮地 4735-6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
市原胃腸科外科	☎ 34-1211	黒川 1484									●			●
脇胃腸科	☎ 32-2500	内牧 1049									●			●
小野主生医院	☎ 32-0039	内牧 227-12	●	●			●				●	●		●
問端内科	☎ 32-0102	内牧 115									●			●
家入整形外科	☎ 32-0048	内牧 353									●			●
阿蘇温泉病院	☎ 32-0881	内牧 1153-1	●	●	●					●				●
さかなしハートクリニック	☎ 24-6262	小里 249-2									●			●
たくもと小児科クリニック	☎ 34-2202	黒川 1499-4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
栗林内科医院	☎ 24-1024	一の宮町宮地 3088-1									●	●		●
阿蘇医療センター	☎ 34-0311	黒川 1266	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
波野診療所	☎ 24-2203	波野大字波野 2703									●		●	●

●平成 27 年度 阿蘇市定期予防接種年間計画表

	0 歳	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳～20 歳		
ヒブ	→					【対 象】 生後 2 カ月～5 歳未満						
	接種開始時期により、接種回数や接種間隔が異なります。詳しくはお問い合わせください。											
小児用肺炎球菌	→					【対 象】 生後 2 カ月～5 歳未満						
	接種開始時期により、接種回数や接種間隔が異なります。詳しくはお問い合わせください。											
四種混合	→					【対 象】 生後 3 カ月～7 歳 6 か月未満						
	初回 20 日～56 日間あけて 3 回 追加 初回接種終了後、12 カ月～18 カ月の間に 1 回											
三種混合	→					【対 象】 生後 3 カ月～7 歳 6 か月未満						
	初回 20 日～56 日間あけて 3 回 追加 初回接種終了後、12 か月～18 か月の間に 1 回 ※三種混合ワクチンが不足した場合は、不活化ポリオワクチンを 4 回接種していただければ、4 種混合ワクチンを接種することができます。											
ポリオ	→					【対 象】 生後 3 カ月～7 歳 6 か月未満						
	初回 20 日～56 日間あけて 3 回 追加 初回接種終了後、12 カ月～18 カ月の間に 1 回 ▶三種混合を 1 回以上受け、ポリオ未接種の人：20 日以上の間隔をあけて 3 回+追加 1 回 ▶生ポリオワクチン 1 回接種の人：初回のポリオ接種を 20 日以上の間隔をあけて 2 回+追加 1 回 ▶不活化ポリオワクチン 1 回～3 回接種の人：合計 3 回となるように接種+追加 1 回											
B C G	→	【対 象】 生後 5 カ月～8 カ月未満				1 回接種						
麻疹風しん	→	【対 象】 1 歳～2 歳未満 (1 期)				1 回接種						
						→				【対 象】 就学前児 (2 期)		
						1 回接種						
水痘	→			【対 象】 1 歳～3 歳未満								
	初回 12 カ月～15 カ月に 1 回 追加 初回接種終了後、6 カ月～12 カ月の間に 1 回											
日本脳炎				→						→		
				【対 象】 3 歳～7 歳 6 か月未満 (1 期)						【対 象】 9 歳～13 歳未満 (2 期)		
	【1 期】 初回 6 日～28 日間隔で 2 回 追加 初回終了後、6 カ月～約 1 年後に 1 回 【2 期】 1 回接種											
	※平成 7 年 4 月 2 日～平成 19 年 4 月 1 日生まれの方は、20 歳未満まで受けることができます。											