

阿蘇市 子どもの予防接種スケジュール表

窓口用

【定期予防接種の種類】


(標準的な接種年齢)

ワクチン		対象年齢	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳 6か月	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	～16歳	～	20歳
ロ タ ウ イ ル ス	ロタリックス(1価) 生経	生後6週から生後24週	① ② 27日以上の間隔をあける (1回目の接種は、14週6日まで)			※生後24週まで																						
	ロタテック(5価) 生経	生後6週から生後32週	① ② ③ 27日以上の間隔をあける (1回目の接種は、14週6日まで)				※生後32週まで																					
ヒブ	不活化	生後2ヶ月から5歳未満	① ② ③ 27日から56日までの間隔をあけて3回、その後7月から13月までの間隔をあけて1回										※1回目の接種が生後7か月以降になった場合は、接種回数が変わります。 お問い合わせください。															
小児用肺炎球菌	不活化	生後2ヶ月から5歳未満	① ② ③ 27日以上の間隔をあけて3回、その後60日以上あけて1回。(ただし、4回目は1歳を過ぎてから)										※1回目の接種が生後7か月以降になった場合は、接種回数が変わります。 お問い合わせください。															
B型肝炎	不活化	生後2ヶ月から1歳未満	① ② ③ 27日以上の間隔をあけて2回、その後1回目の接種から139日以上あけ										※ただし、母がHBs抗原陽性でB型肝炎ウイルスに感染した可能性がある場合に B型肝炎ウイルスの投与を受けたことがある場合は、対象外。															
四種混合 (ポリオ・ジフテリア・ 破傷風・百日咳)	不活化	生後2ヶ月から7歳6か月未 満	① ② ③ 20日から56日までの間隔をあけて3回、その後12か月から18か月までの間隔をあけて1回										④										二種混合 ※2 ①					
五種混合 (ポリオ・ジフテリア・ 破傷風・百日咳・ヒブ)	不活化	生後2ヶ月から7歳6か月未 満	① ② ③ 20日から56日までの間隔をあけて3回、その後6か月から18か月までの間隔をあけて1回										④										二種混合 ※2 ①					
BCG	生	生後5ヶ月から1歳未満						① 5か月から8か月の間に1回																				
水痘	生	1歳から3歳未満											① ② 6月から12月の 間隔をあけて2回															
麻しん風しん	生	1期:1歳から2歳未満 2期:年長児											1期 ①		2期 ③													
日本脳炎※1	不活化	1期:6か月から7歳6か月 未満 2期:9～13歳未満											1期 ① ② ③ 6日から28日の間隔をあけて2回、					2期 ①										
ヒトパピローマウイルス感染症 (2価・4価・9価)	不活化	小学6年生～高校1年生 相当の女の子											※3種類のワクチンがあり、基本的には同じワクチンを3回接種します。 接種する年齢・ワクチンによって接種の回数・間隔が異なります。										① ② ③			※初回から6月の間 隔をあけて3回目		

※1 日本脳炎は、以下の特例対象者も定期予防接種対象となります。
平成17年4月2日から平成19年4月1日生まれの者で20歳未満にある者

【他の予防接種との間隔について】

医師の認めた場合は、同時接種も可能です。同一ワクチンを複数回接種する場合は、上記のスケジュールを参考ください。



わからないことがあればいつでもご連絡ください



【連絡先】
阿蘇市健康増進課
(一の宮保健センター)
電話 0967-22-5088
お知らせ端末 0967-55-5088